

## 【適用病害・使用目的と使用方法】

| 作物名             | 適用病害名                                                                            | 希釈<br>倍数                                          | 使用<br>液量                 | 使用時期                     | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用<br>方法 | ピラクロストロビン<br>を含む農薬の<br>総使用回数 | フルキサピロキサド<br>を含む農薬の<br>総使用回数 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| 西洋芝<br>(ベントグラス) | 葉腐病(ブラウンパッチ)<br>赤焼病<br>ピシウム病<br>炭疽病<br>ダラースポット病<br>紅色雪腐病                         | 100 倍                                             | 100<br>ml/m <sup>2</sup> | 発病前<br>～<br>発病初期         | 3 回<br>以内           | 散布       | 3 回以内                        | 4 回以内                        |
|                 |                                                                                  | 200 倍                                             | 200<br>ml/m <sup>2</sup> |                          |                     |          |                              |                              |
|                 |                                                                                  | 500 倍                                             | 500<br>ml/m <sup>2</sup> |                          |                     |          |                              |                              |
|                 | 雪腐小粒菌核病                                                                          | 100 倍                                             | 100<br>ml/m <sup>2</sup> | 根雪前                      |                     |          |                              |                              |
|                 |                                                                                  | 200 倍                                             | 200<br>ml/m <sup>2</sup> |                          |                     |          |                              |                              |
|                 |                                                                                  | 500 倍                                             | 500<br>ml/m <sup>2</sup> |                          |                     |          |                              |                              |
|                 | フェアリーリング病                                                                        | 500 倍                                             | 500<br>ml/m <sup>2</sup> |                          |                     |          |                              |                              |
|                 |                                                                                  | 1000 倍                                            | 1<br>ℓ/m <sup>2</sup>    |                          |                     |          |                              |                              |
|                 | 西洋芝<br>(バーミューダ<br>グラス)                                                           | ピシウム病<br>ダラースポット病<br>カーブラリア葉枯病<br>ネクロティックリングスポット病 | 100 倍                    | 100<br>ml/m <sup>2</sup> |                     |          |                              |                              |
| 200 倍           |                                                                                  |                                                   | 200<br>ml/m <sup>2</sup> |                          |                     |          |                              |                              |
| 500 倍           |                                                                                  |                                                   | 500<br>ml/m <sup>2</sup> |                          |                     |          |                              |                              |
| 日本芝             | ダラースポット病<br>カーブラリア葉枯病<br>葉腐病(ラージパッチ)<br>炭疽病<br>立枯病(ゾイシアデクライン)<br>ネクロティックリングスポット病 | 100 倍                                             | 100<br>ml/m <sup>2</sup> |                          |                     |          |                              |                              |
|                 |                                                                                  | 200 倍                                             | 200<br>ml/m <sup>2</sup> |                          |                     |          |                              |                              |
|                 |                                                                                  | 500 倍                                             | 500<br>ml/m <sup>2</sup> |                          |                     |          |                              |                              |

| 作物名             | 使用目的  | 希釈<br>倍数 | 使用<br>液量                 | 使用時期 | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用<br>方法 | ピラクロストロビン<br>を含む農薬の<br>総使用回数 | フルキサピロキサド<br>を含む農薬の<br>総使用回数 |
|-----------------|-------|----------|--------------------------|------|---------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| 西洋芝<br>(ベントグラス) | 根重の増加 | 100 倍    | 100<br>mℓ/m <sup>2</sup> | 芝生育期 | 3 回<br>以内           | 散布       | 3 回以内                        | 4 回以内                        |
|                 |       | 200 倍    | 200<br>mℓ/m <sup>2</sup> |      |                     |          |                              |                              |
|                 |       | 500 倍    | 500<br>mℓ/m <sup>2</sup> |      |                     |          |                              |                              |

