

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	インドキサカルブ を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ	1000～ 2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内	散布	2 回以内
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ ウワバ類	2000 倍				無人航空機 による散布	
	ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ	10 倍	1～2 ℓ/10a				
	コナガ アオムシ						
はくさい	コナガ アオムシ	1000～ 2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 21 日 前まで		散布	
	ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 シロイチモジヨトウ ウワバ類	2000 倍				無人航空機 による散布	
	コナガ アオムシ	10 倍	1～2 ℓ/10a				
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 21 日 前まで	散布		
		20 倍	1～2 ℓ/10a		無人航空機 による散布		
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ウワバ類	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 14 日 前まで	散布		
		20 倍	1～2 ℓ/10a		無人航空機 による散布		
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000 倍	100～300 ℓ/10a		散布		
		10 倍	1～2 ℓ/10a		無人航空機 による散布		
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	散布		
なす	ハスモンヨトウ オオタバコガ テントウムシダマシ類						
トマト	ハスモンヨトウ オオタバコガ トマトキバガ						
ピーマン	オオタバコガ						
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類 シロイチモジヨトウ			20 倍		1～2 ℓ/10a	無人航空機 による散布
えだまめ	ハスモンヨトウ	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 7 日 前まで	散布		
だいず		8～16 倍	800 mℓ/10a		無人航空機 による散布		

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	インドキサカルブ を含む農薬の 総使用回数
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内	散布	2 回以内
		20 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
さといも	ハスモンヨトウ	2000 倍	100～300 ℓ/10a			散布	
		20 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
しょうが	ハスモンヨトウ アワノメイガ	2000 倍	100～300 ℓ/10a		3 回 以内	散布	3 回以内
		20 倍	1～2 ℓ/10a			無人航空機 による散布	
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ	2000 倍	100～180 ℓ/10a	収穫 10 日 前まで	1 回	散布	1 回
きく	ハスモンヨトウ オオタバコガ シロイチモジヨトウ	2000 倍	100～300 ℓ/10a	発生初期	4 回 以内	散布	4 回以内
樹木類 (さくらを除く)	ケムシ類	4000 倍	200～700 ℓ/10a	発生初期			
さくら		1000 倍	200～500 ℓ/10a	成虫 発生初期			

